

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

1/2頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	063	CODE	003040001063
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	CBDCA+PEM+Amivantamab【1サイクル目/80kg未満】		
申請年月日	令和 7 年 3月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m ²
カルボプラチナ	DIV	5 AUC
ライブリバント(day1)	DIV	350 mg/body
ライブリバント(day2)	DIV	1050 mg/body
ライブリバント(day8,15)	DIV	1400 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認
医師	看護師	薬剤師	
	●		

総輸液量 : L
 投与時間 : 時間 分

※ライブリバントは希望後10時間以内に投与終了すること

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール																										
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ビタミンB12 1mg 手技:筋肉内 経路:9週毎に1回投与する	im		●																									
2	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:フィルター使用	30分 DIV		●																								(●)	
3	ペメトレキセド ()mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																							(●)		
4	カルボプラチナ ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																							(●)		
5	生食 100mL 手技:静脈内 経路:前投薬服用	30分 DIV		●																							(●)		
6	生食 100mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:前投薬服用/フィルター使用	30分 DIV			●																								
7	ライブリバント 350mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	50mL/hr DIV		●																								※2時間経過後、IR出現なければ75mL/hrで投与可能	
8	ライブリバント 1050mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	33mL/hr DIV		●																								※2時間経過後、IR出現なければ50mL/hrで投与可能	
9	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	65mL/hr DIV														●													
10	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	85mL/hr DIV																●											

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

2/2頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	063	CODE	003040001063
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	CBDCA+PEM+Amivantamab【1サイクル目/80kg未満】		
申請年月日	令和 7 年 3月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m ²
カルボプラチナ	DIV	5 AUC
ライブリバント(day1)	DIV	350 mg/body
ライブリバント(day2)	DIV	1050 mg/body
ライブリバント(day8,15)	DIV	1400 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認
	●		

総輸液量 : L
 投与時間 : 時間 分

※ライブリバントは希釈後10時間以内に投与終了すること

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	125mL/hr DIV																								●					
12	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●	●							●								●				●							
13	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●	●							●													●						