

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	064	CODE	003040001064
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	CBDCA+PEM+Amivantamab【2サイクル目/80kg未満】		
申請年月日	令和 7 年 3月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m ²
カルボプラチナ	DIV	5 AUC
ライブリバント	DIV	1400 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認
	●		

総輸液量 : L
 投与時間 : 4 時間 30 分

※ライブリバントは希望後10時間以内に投与終了すること

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ビタミンB12 1mg 手技:筋肉内 経路:9週毎に1回投与する	im		●																										
2	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:フィルター使用	30分 DIV		●																							(●)			
3	ペメトレキセド ()mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																						(●)				
4	カルボプラチナ ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																						(●)				
5	生食 100mL 手技:静脈内 経路:前投薬服用	30分 DIV		●																						(●)				
6	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	125mL/hr DIV		●																										
7	ライブリバント 1750mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	125mL/hr DIV																								(●)				
8	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																						(●)				
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																						(●)				
10	手技: 経路:																													