

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	066	CODE	003040001066
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	PEM+Amivantamab【維持療法/80kg未満】		
申請年月日	令和 7 年 3月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m ²
ライブリバント	DIV	1750 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認
	●		医師 看護師 薬剤師

総輸液量 : L
 投与時間 : 4 時間 0 分

※ライブリバントは希望後10時間以内に投与終了すること

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール																										
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ビタミンB12 1mg 手技:筋肉内 経路:9週毎に1回投与する	im		●																									
2	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:フィルター使用/前投薬服用	30分 DIV		●																					(●)				
3	ペメトレキセド ()mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)				
4	ライブリバント 1750mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	125mL/hr DIV		●																					(●)				
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																					(●)				
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					(●)				
7	手技: 経路:																												
8	手技: 経路:																												
9	手技: 経路:																												
10	手技: 経路:																												