

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	071	CODE	003040001071
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	Amivantamab+Lazertinib【1サイクル目/80kg未満】		
申請年月日	令和 7 年 8月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ライブリバント(day1)	DIV	350 mg/body
ライブリバント(day2)	DIV	700 mg/body
ライブリバント(day8,15,22)	DIV	1050 mg/body
ラズクルーズ	PO	240 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認
医師	看護師	薬剤師	
	●		

総輸液量 : L
 投与時間 : 時間 分

※ライブリバントは希望後10時間以内に投与終了すること

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日) 《 》 クール																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	生食 100mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:前投薬服用/フィルター使用	30分 DIV		●	●																												
2	生食 100mL 手技:静脈内 経路:前投薬服用/フィルター使用	30分 DIV									●																				●		
3	ライブリバント 350mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	50mL/hr DIV		●																													
4	ライブリバント 700mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	50mL/hr DIV			●																												
5	ライブリバント 1050mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	85mL/hr DIV										●																					
6	ライブリバント 1050mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	125mL/hr DIV																			●											●	
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●	●							●									●										●		
8	ヘパリンNaロックシリング 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●	●							●									●										●		
9	ラズクルーズ錠 240mg 手技:内服 経路:1日1回	PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		