

## 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	045	CODE	004015004045
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DBLd(1-2サイクル・移植非適応)		
申請年月日	令和7年8月4日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ボルテゾミブ	皮下	1.3 mg/m <sup>2</sup>
デカドロン	内服	20 mg/body
ダラキユーロ	皮下	1800 mg/body
レナリドミド	内服	25 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認
		●	

※ ダラキユーロ投与1-3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

※ ロイコトリエン阻害薬:1サイクル目の1日目に任意で投与可

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日) 《 2 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ボルテゾミブ ( )mg + 生食20mL 手技:皮下 経路:	皮下		●				●			●		●																		
2	ダラキユーロ 1800mg ( 15mL ) 手技:皮下 経路:前投確認/30mLシリンジ	3~5分 s.c		●							●										●										
3	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:	内服		●	●		●	●			●	●		●	●					●											
4	レナリドミド ( )mg 手技:内服 経路:	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
5	手技: 経路:																														
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														