

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	047	CODE	004015004047
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DBLd(9サイクル以降:移植非適応)		
申請年月日	令和7年8月4日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ダラキьюロ	皮下	1800 mg/body
デカドロン	内服	40 mg/body
レナリドミド	内服	25 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認
		●	

※ ダラキьюロ投与1ー3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

投与順	投与内容	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ダラキьюロ 1800mg (15mL) 手技:皮下 経路:前投確認/30mLシリンジ	3~5分 s.c		●																										
2	デカドロン 40mg 手技:内服 経路:	内服		●							●								●						●					
3	レナリドミド ()mg 手技:内服 経路:	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	手技: 経路:																													
5	手技: 経路:																													
6	手技: 経路:																													
7	手技: 経路:																													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													