

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	048	CODE	004015004048
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DBLd(1-2サイクル:移植適応)		
申請年月日	令和7年8月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ボルテゾミブ	皮下	1.3 mg/m ²
デカドロン	内服	40 mg/body
ダラキューロ	皮下	1800 mg/body
レナリドミド	内服	25 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
		●	医師	看護師	薬剤師

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

※ ロイコトリエン阻害薬:1サイクル目の1日目に任意で投与可

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 2 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ボルテゾミブ ()mg+生食20mL 手技:皮下 経路:	皮下		●			●				●		●												●						
2	ダラキューロ 1800mg (15mL) 手技:皮下 経路:前投確認/30mLシリンジ	3~5分 s.c		●							●							●							●						
3	デカドロン 40mg 手技:内服 経路:	内服		●	●	●	●					●	●	●	●																
4	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:ダラキューロ投与1-3時間前	内服									●							●							●						
5	レナリドミド ()mg 手技:内服 経路:	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														