

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC (ICI)		
No(3桁)	060	CODE	003050001060
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CBDCA+PTX+Durva		
申請年月日	令和7年10月6日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body
パクリタキセル	DIV	200 mg/m ²
カルボプラチナ	DIV	6 AUC

Aポート	Vポート	末梢	確認
	●		医師 看護師 薬剤師

総輸液量 : 0.95 L
投与時間 : 5 時間 40 分

※扁平上皮型:術前に4サイクル投与、術後イミフィンジ単剤12サイクル(4週毎)

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日) 《 4 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV		●																					●					
2	イミフィンジ 1500mg+生食 100mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					●					
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●					
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 16.5mg +ファモチジン 20mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:レスタンミンコワ5錠服用/DEX:減量しない(PTX前投)	30分 DIV		●																					●					
5	パクリタキセル ()mg +5%ブドウ糖 500mL 手技:静脈内 経路:	3時間 DIV		●																					●					
6	カルボプラチナ ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV		●																					●					
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					●					
8	ヘパリンNaロックシリング 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					●					
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													