

化 学 療 法 レ ジ イ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1 頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC (ICI)		
No(3桁)	063	CODE	003050001063
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CBDCA+PEM+Durva		
申請年月日	令和 7 年 10月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m ²
カルボプラチニ	DIV	5 AUC

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
総輸液量 : 0.6 L	投与時間 : 3 時間 0 分				

※非扁平上皮型:術前に4サイクル投与、術後イミフィンジ単剤12サイクル(4週毎)

投与スケジュール： (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日) 《 4 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力		-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																												
1	メコバラミン 500 μ g 2A 手技:筋注 経路:9週毎に1回投与	im				●																											
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV				●																						(●)					
3	イミフィンジ 1500mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV				●																						(●)	(●)				
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV				●																						(●)	(●)				
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:	30分 DIV				●																						(●)	(●)				
6	ペメトレキセド ()mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV				●																						(●)	(●)				
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV				●																						(●)	(●)				
8	カルボプラチナ ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV				●																						(●)	(●)				
9	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV				●																						(●)	(●)				
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV				●																						(●)	(●)				