

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	自己免疫性疾患		
No(3桁)	002	CODE	004021001002
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Rituxan		
申請年月日	令和7年11月17日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキサン	DIV	375 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日)《 》クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	レスタミンコーワ錠 3錠+カロナール200mg 4錠+ファモチジン20mg 1錠 手技: 経路:リツキサンの約30分前に	p.o		●																												
2	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用	IV		●																												
3	リツキサン()mg+生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 前投薬の30分後に開始する	右記参照 DIV		●	投与速度25ml/hrで開始し1時間毎に100・200とする。生食で1mg/mLに希釈する。																											
4	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																												
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																												
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																												
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															