化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	胸腺がん		
No(3桁)	001	CODE	003006001001
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CBDCA+PTX+Atezo(リザーバー)		
申請年月日	令和 8 年 4月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
テセントリク	DIV	1200 mg/body
パクリタキセル	DIV	200 mg/㎡
カルボプラチン	DIV	6 AUC

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 1.2 L
投与時間 : 5 時間 40 分

※4～6サイクル投与後、Atezo単剤

※ DEXはPTXのアレルギー予防のため減量しない

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 4～6 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																					(●)					
2	テセントリク 1200mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	30-60分 DIV			●	2回目以降:30分																				(●)					
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)					
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 16.5mg +ファモチジン 20mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ5錠服用	30分 DIV			●																					(●)					
5	パクリタキセル ( )mg +5%ブドウ糖 500mL 手技:静脈内 経路:	3時間 DIV			●																					(●)					
6	カルボプラチン ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV			●																					(●)					
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●																					(●)					
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●																					(●)					
9	手技:静脈内 経路:																														
10	手技:静脈内 経路:																														

レジメ検討委員会