化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	周術期		
No(3桁)	011	CODE	003065001011
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CBDCA+GEM+Durva(術前④)		
申請年月日	令和 7 年 10月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/㎡
カルボプラチン	DIV	5 AUC

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 0.6 L
投与時間 : 3 時間 20 分

※扁平上皮型:術前に4サイクル投与、術後イミフィンジ単剤12サイクル(4週毎)

投与スケジュール: (2 投 1 休) or (投与間隔 21 日)《 4 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																					(●)						
2	イミフィンジ 1500mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)						
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)						
5	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV										●																				
6	ゲムシタビン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●							●														(●)						
7	カルボプラチン ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)						
8	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●							●														(●)						
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●							●														(●)						
10	手技: 経路:																															

レジメ検討委員会