化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	周術期		
No(3桁)	012	CODE	003065001012
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CDDP+GEM+Durva(術前④)		
申請年月日	令和 7 年 10月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/㎡
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.1 L
投与時間 : 5 時間 40 分

※扁平上皮型:術前に4サイクル投与、術後イミフィンジ単剤12サイクル(4週毎)

投与スケジュール: (2 投 1 休) or (投与間隔 21 日)《 4 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																					(●)								
2	イミフィンジ 1500mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)								
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)								
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)								
5	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV										●																						
6	ゲムシタビン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●							●														(●)								
7	ソルデム3A 500mL +硫酸Mg補正液 8mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)								
8	マンニットールS 300mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)								
9	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)								
10	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)								

レジメ検討委員会

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	周術期		
No(3桁)	012	CODE	003065001012
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CDDP+GEM+Durva(術前④)		
申請年月日	令和 7 年 10月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/㎡
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.1 L
投与時間 : 5 時間 40 分

※扁平上皮型:術前に4サイクル投与、術後イミフィンジ単剤12サイクル(4週毎)

投与スケジュール: (2 投 1 休) or (投与間隔 21 日)《 4 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●							●														(●)						
12	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●							●														(●)						
13	OS-1 1000mL 手技:静脈内 経路:3日間服用	P.O			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				