

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	外来化学療法		
No(3桁)	021	CODE	004001001021
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Pola+CHP(THP)【外来用】		
申請年月日	令和6年2月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
ピノルビン	DIV	30 mg/m ²
エンドキサン	DIV	500 mg/m ²
プレドニン	p.o	30 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
4	時間 00 分	Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

※ 30mg/V:DW 1.8mLで溶解、140mg/V:DW 7.2mLで溶解(20mg/mL)

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

※ ポライビー:希釈後最終濃度:0.72mg/mL~2.70mg/mL

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間	投与スケジュール																																																
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
1	プレドニン錠 ()錠 手技:内服 経路: p.o			●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●																							
2	グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路:前投服用/フィルター使用 30分 DIV			●																					●																											
3	ポライビー ()mg +生食 50mL +注射用水 20mL 手技:静脈内 経路:DW溶解(20mg/mL)/前投服用30分後 90-30分 DIV			●	90分、2回目以降は30分可																																															
4	ピノルビン ()mg +5%ブドウ糖 100mL 手技:静脈内 経路: 30分 DIV			●																					●																											
5	エンドキサン ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事 2時間 DIV			●																					●																											
6	生食 50mL 手技:静脈内 経路: 500mL/hr DIV			●																					●																											
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路: IV			●																					●																											
8	手技: 経路:																																																			
9	手技: 経路:																																																			