

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	055	CODE	004005001055
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Ph(-)B-ALL MRD2025 C-1		
申請年月日	令和8年3月13日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.3 mg/m ²
メソトレキセート	DIV	2000 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m ²
髄注	IT	MTX15mg+DEX3.3mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	グラニセトロンバッグ50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV	●																													
2	オンコビン()mg+生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV	●																													
3	メソトレキセート()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 DIV	●	※40歳から54歳は1500mg/m ² で投与 55歳から70歳は1000mg/m ² で投与																												
4	ソルデム3A 1000mL+ ソルデム1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 DIV	●																													
5	ロイコボリン 15mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始36hr後から6hr毎に8回	IV		①	④	③																										
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用	DIV		●																												
7	ロイナーゼ()mg+注射用水+5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用	4時間 DIV		●																												
8	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																												
9	ヘパリンロックシリンジ 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●																												
10	手技: 経路:																															