

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	056	CODE	004005001056
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Ph(-)B-ALL MRD2025 A-2		
申請年月日	令和8年3月13日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
プレドニン(Max100mg)	p.o.	60 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(Max2mg)	DIV	1.3 mg/m <sup>2</sup>
ダウノマイシン	DIV	40 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	1000 mg/m <sup>2</sup>
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

髄注	IT	MTX15mg+DEX3.3mg/body
----	----	-----------------------

※フィルグラスチム150 μg sc : day6~好中球数>5000mm<sup>3</sup>まで継続

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
1	プレドニン( )mg (朝 -昼) 手技:経口 経路:	内服	●	●	●	●	●	●	●	※55歳以上:8日目からTapering										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセトロンバッグ50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV	●	●	●																																
3	オンコビン( )mg+生食50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV	●																																		
4	ダウノマイシン( )mg+生食100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV	●	●	●																																
5	エンドキサン( )mg+生食250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV	●																																		
6	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV	●	●	●																																
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用	IV																																			
8	ロイナーゼ( )mg+注射用水+5%ブドウ糖250mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用	4時間 DIV																																			
9	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV																																			
10	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:	IV	●	●	●																																