

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	122	CODE	004012001122
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	R-Pola+GHP		
申請年月日	令和7年12月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m ²
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m ²
エンドキサン	DIV	750 mg/m ²
プレドニン	p.o	100 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 30mg/V:DW 1.8mLで溶解、140mg/V:DW 7.2mLで溶解(20mg/mL)

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール

※ ポライビー:希釈後最終濃度:0.72mg/mL~2.70mg/mL

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/前投服用			●																					(●)						
2	リツキシマブ ()mg +生食500mL 手技:静脈内 経路:前投服用30分後/1mg/mLに希釈			●																					(●)						
3	プレドニン錠 20錠 手技:内服 経路:	p.o			●	●	●	●	●																(●)	(●)	(●)	(●)	(●)		
4	グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路:前投服用/フィルター使用	IV			●																				(●)						
5	ポライビー ()mg +生食 50mL +注射用水 20mL 手技:静脈内 経路:DW溶解(20mg/mL)/前投服用30分後	90-30分 DIV			●																					(●)					
6	ドキシソルビシン ()mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV			●																					(●)					
7	エンドキサン ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV			●																					(●)					
8	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV		●	●																				(●)	(●)					
9	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●	●																					(●)	(●)				
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●	●																					(●)	(●)				