

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	052	CODE	004017001052
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	★BU+CY②(60×2)		
申請年月日	令和 4 年	7月7日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ブスルフェクス	DIV	0.8×4回 mg/kg
エンドキサン	DIV	60 mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間	日																																								
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
1	パロノセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: アプレピタント併用	30分	DIV		●																																							
2	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間	DIV			●	●	●	●																																			
3	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間	DIV		●	●	●	●																																				
4	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間	DIV		●	●	●	●																																				
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分	DIV		●	●	●	●																																				
6	ブスルフェクス()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔で	2時間	DIV		●	●	●	●																																				
7	エンドキサン()mg + 生食500mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間	DIV							●	●																																	
8	ウロミテキサン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: CY開始0・4・8時間後	15分	DIV							●	●	●	1回量はエンドキサンの1日量の約40%																															
9	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間	CIV		●	●	●	●	●	●	●																																	
10	手技: 経路:																																											