化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー
適応	陰茎癌		
No(3桁)	001	CODE	005008001001
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	TIP【APR併用】		
申請年月日	令和 8 年 4月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	175 mg/㎡
イホマイド	DIV	1200 mg/㎡
シスプラチン	DIV	25 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 3.5 mL	
14 時間 15 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 4 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:【1日目】フィルター使用	2時間 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
2	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 19.8mg +ファモチジン 20mg 手技:静脈内 経路:レスタミン5錠服用/APR併用/DEX・アレルギー予防(減量しない)	30分 DIV			●																					(●)						
3	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV				●	●																				(●)	(●)				
4	パクリタキセル ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:	3時間 DIV			●																					(●)						
5	ウロミテキサン 400mg/㎡ +生食 50mL 手技:静脈内 経路:イホマイド開始前	15分 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
6	イホマイド ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:希釈後6hr以内に投与終了	2時間 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
7	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
8	フロセミド 20mg 手技:静脈内 経路:	IV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
9	ウロミテキサン 200mg/㎡ +生食 50mL 手技:静脈内 経路:イホマイド開始4時間後	15分 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
10	生食 1000mL +メイロン 40mL 手技:静脈内 経路:	4時間 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー
適応	陰茎癌		
No(3桁)	001	CODE	005008001001
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	TIP【APR併用】		
申請年月日	令和 8 年 4月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	175 mg/㎡
イホマイド	DIV	1200 mg/㎡
シスプラチン	DIV	25 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 3.5 mL	
14 時間 15 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 4 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	☑	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11	ウロミテキサン 200mg/㎡ +生食 50mL 手技:静脈内 経路:イホマイド開始8時間後	15分 DIV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				
12	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				