

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	079	CODE	001002001079
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼D-FLOT		
申請年月日	令和 8 年 7月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body
ドセタキセル	DIV	50 mg/m ²
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	100 mg/m ²
フルオロウラシル	DIV	2600 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
時間	分	Mg ²⁺	mEq	K ⁺	mEq

※術前術後共に2サイクルまで。術後2サイクル後はDurvalumab単剤を最大10回まで。

※オランザピン(day0-4またはday1-4)、G-CSFの一次予防投与を考慮

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 2 》クール

※オランザピン(day0-4またはday1-4)、G-CSFの一次予防投与を考慮			Total時間入力		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング/フィルター使用	DIV		●																												●
2	イミフィンジ 1500mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●																												●
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 経過観察	10分 DIV		●																												●
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 235mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●														●														●
5	ドセタキセル ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●														●														●
6	オキサリプラチン ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														●														●
7	レボホリナート ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●														●														●
8	フルオロウラシル ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 DIV		●														●														●
9	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●														●													
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV			●														●													